



SERVICIO DE ECOGRAFÍA VETERINARIA ALERTA VET PRO

INFORME ECOGRÁFICO ABDOMINAL

NOMBRE: PELUSA

ESPECIE: Canino

SEXO: Hembra (entera)

RAZA: Mestiza

EDAD: 9 años

PROPIETARIO: Familia Ríos

FECHA: 09/11/2023

Motivo del estudio: *Paciente presenta una masa en la zona inguinal izquierda.*

- **Vejiga**

Topografía: conservada

Distensión: leve

Pared: espesor conservado de 1.5 mm en la pared ventral y de 0.9 mm en la pared dorsal

Capa mucosa: conservada

Contenido: anecogénico

Cuello vesical: conservado

- **Ovario**

Ovario izquierdo

No se evidencia alguna estructura en su zona topografía.

Ovario derecho

Tamaño: conservado de 10 mm x 5.3 mm

Ecogenicidad: levemente hipoecogénico

- **Útero**

Cuerpo uterino

Espesor: conservado de 5.8 mm de espesor

Contenido: ausente

Cuernos uterinos

Topografía: se evidencia porción de cuerno en el mesogastrio izquierdo y medio y otra porción del cuerno uterino en el saco herniario inguinal izquierdo

Distensión: moderada distensión de 9.5 mm a 24 mm de espesor total

Pared: conservada de 0.9 mm

Contenido: líquido de moderada celularidad y contenido mucoide

- **Riñón izquierdo**

Topografía: conservada

Tamaño: 37.1 mm de longitud

Contornos: discretamente irregulares

Ecogenicidad de corteza: levemente incrementada

Espesor de corteza: conservado

Ecogenicidad de médula: conservada

Diferenciación córtico medular: conservada

Pelvis: conservada

Divertículos pélvicos: levemente mineralizados

- **Riñón derecho**

Topografía: conservada

Tamaño: 41.3 mm de longitud

Contornos: conservados

Ecogenicidad de corteza: levemente incrementada
Espesor de corteza: conservado
Ecogenicidad de médula: conservada
Diferenciación córtico medular: conservada
Pelvis y divertículos: conservados

- **Hígado**

Tamaño: conservado
Bordes: conservados
Ecogenicidad: levemente hipoecogénico
Ecotextura: granular mixto
Venas hepáticas y vasos portales: conservados

- **Vesícula biliar**

Distensión: leve a moderada
Pared: espesor conservado de 1 mm
Contenido: moderada cantidad de material ecogénico móvil

- **Estómago**

Distensión: moderada
Pared: espesor conservado de 2 mm en el fundus gástrico, de 2.6 mm en el cuerpo gástrico y de 4.2 mm en el antro pilórico
Estratificación de capas: conservada
Contenido: moderada cantidad de gas y contenido alimenticio digerido
Peristaltismo: conservado
Píloro: conservado

- **Intestino delgado**

Duodeno: pared de espesor conservado, estratificación de capas conservada con moderado incremento de la ecogenicidad de la capa mucosa, contenido líquido y mucoide.
Asas intestinales de abdomen medio (yeyuno): paredes de espesor conservado de 1.4 mm a 3.7 mm, estratificación de capas conservada, conteniendo mucoide y peristaltismo conservado.
Íleon: espesor conservado, estratificación de las capas conservada y contenido mucoide.
Unión íleocólica: conservada

- **Colon**

Pared: espesor conservado de 1.6 mm en el colon descendente, de 2.5 mm en el colon transversal y de 1.7 mm en el colon ascendente
Estratificación de capas: conservada
Contenido: fecal sólido y gaseoso

- **Páncreas**

Zona topográfica ecográficamente conservada (isoecogénica a la grasa periférica).

- **Bazo**

Tamaño: levemente incrementado de 12.6 mm a nivel del hilio esplénico
Bordes: levemente redondeados
Ecogenicidad: conservada
Vasos esplénicos: conservados

- **Glándulas adrenales**

Glándula adrenal izquierda

Forma: conservada
Polo craneal: 3.9 mm
Polo caudal: 4.4 mm

Glándula adrenal derecha

Forma: conservada

Polo craneal: 4 mm

Polo caudal: 2.8 mm

- **Cavidad abdominal**

Líquido libre: ausente

Linfonodos iliacos medios: zona topográfica conservada.

Linfonodos mesentéricos: zona topográfica conservada.

Conclusiones (Hallazgos ecográficos sugerentes a):

- **CUERNOS UTERINOS DISTENDIDOS** (teniendo espesor de 10 mm a 24 mm a lo largo de su trayecto) **CON COLECTA LÍQUIDA DE MODERADA CELULARIDAD SUGERENTE DE HEMOMETRA O PIOMETRA.** Parte de los cuernos uterinos se evidencia en mesogastrio izquierdo y medio y otra parte en el saco herniario inguinal izquierdo. *Se sugiere correlacionar estos hallazgos con la signología y analítica sanguínea.*
- **LEVE NEFROPATIA BILATERAL DIFUSA O LEVES CAMBIOS DEGENERATIVOS ASOCIADOS A LA EDAD.** *Se sugiere complementar con analítica sanguínea / SDMA. Se sugiere control ecográfico para evaluación de la mineralización de divertículos pélvicos.*
- **VESÍCULA BILIAR DE PAREDES CONSERVADAS CON PRESENCIA DE MODERADA CANTIDAD DE BARRO BILIAR MÓVIL.**
- **EL SACO HERNIARIO INGUINAL IZQUIERDO CONTIENE UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE 14 mm a 24 mm DE ESPESOR TOTAL CON CONTENIDO LÍQUIDO DE MODERADA CELULARIDAD SUGERENTE DE CUERNOS UTERINOS CON COLECTA LÍQUIDA PATOLÓGICA (HEMOMETRA O PIOMETRA); ADEMÁS DE TEJIDO DE ASPECTO GRASA. EL ANILLO HERNIARIO INGUINAL IZQUIERDO MIDE 17.7 mm aprox.**

M.V. Deysi G. Masgo Checco

C.M.V.P. 11792

NOTA: La ecografía es una técnica diagnóstica complementaria cuyos resultados deben ser correlacionados con otros criterios por el médico veterinario tratante, para determinar los procedimientos terapéuticos, quirúrgicos y otros a realizar. Se sugiere corroborar los hallazgos ecográficos con los exámenes laboratoriales correspondientes.











